

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Scientific

علمی

داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا
۰۸ اپریل ۲۰۲۱



داکتر محمد کریم فارغی

Herpes Simplex Virus (HSV)



مرضی که از سبب این وایرس تولید می گردد به طور ساده Herpes نیز گفته می شود و فاکت های ذیل در مورد آن یاد آوری می گردد :

- دو نوع HSV1 و HSV2 وجود دارد

- تب خال به زبان عامیانه یا Cold Sore از سبب نوع HSV1 و در اثر تماس دهن به دهن و استفاده مشترک از ظروف به وجود می آید .

- واقعات انتانی از نوع HSV2 در ناحیه تناسلی به وجود می آید که از طریق تماس جنسی انتقال می یابد.

- هر دو نوع HSV در تمام زندگی با شخص باقی می ماند .

- تخمیناً حدود 3.7 میلیارد نفر که سن کمتر از ۵۰ سال دارند (۶۷٪) در سراسر جهان مصاب HSV1 هستند .

-قرار تخمین ۴۹۱ میلیون انسان بین سنین ۱۵ - ۴۹ در جهان ویروس HSV2 را با خود دارند .

-علائم این مرض شامل سرخی توأم با احساس خارش، سوزنک شدن و سوزش است که بعداً به آبله و ارچق مبدل می گردد.

-مرحله ساری بیشتر در وقت بروز علائم فوق می باشد ولی ویروس می تواند در مرحله ای که علائم وجود ندارد نیز از طریق تماس به وجود بیاید .

-ویروس نوع HSV2 ریسک مصابیت به ویروس ایدز یا HIV را بیشتر می سازد .

واقعات HSV1 می تواند در ناحیه تناسلی نیز سبب عین علائم جوف دهن و یا لب ها گردد ولی خیلی نادر است و گاهی به شکل خفیف تر بوده و مورد توجه قرار نمی گیرد .

واقعات HSV1 در ناحیه تناسلی به طور متکرر به وجود نمی آید در حالی که HSV2 بار بار به وجود می آید .

در واقعات نادر ممکن مادری که HSV1 را در ناحیه تناسلی خود دارد در وقت زایمان آن را به نوزاد انتقال بدهد .

واقعات شدید این مرض در اشخاصی که مقاومت شان پائین است مثلاً مصابین مرض ایدز یا HIV دیده شده است، ندرتاً درین حالات سبب اختلاطاتی چون التهاب دماغی و التهاب قرنیه چشم و کوری می گردد .

آفات نوزادان در وقت ولادت از طریق مادر مصاب به هردو شکل وایرس به وجود آمده می تواند. واقعات نوزادان خوشبختانه خیلی کم است (تخمیناً ۱۰ واقعه در هر ۱۰۰۰۰۰ ولادت) ولی همیشه نهایت جدی سیر می کند زیرا می تواند سبب معلولیت های عصبی و حتی مرگ گردد .

اگر مادر قبل از حمل گرفتن مصاب HSV شده باشد خطر انتقال وایرس به نوزاد آینده اش خیلی ناچیز خواهد بود ولی اگر مادر در سه ماه اخیر حمل برای نخستین بار مصاب HSV گردد خطر جدی متوجه نوزادش می گردد .

تداوی این مرض به منظور کم ساختن شدت آن و اختلاطات ناشی از آن به وسیله دوا های ضد وایرس صورت می گیرد و خوب نتیجه داده است ولی متأسفانه سبب نابودی کامل وایرس از بدن نمی گردد، بناءً جلوگیری از مصابیت به این مرض خیلی مهم پنداشته می شود. جلوگیری از تماس و بوسیدن، به خصوص وقتی علائم فعال مرض وجود دارد و خود داری استفاده مشترک از ظروف مانند گلاس، قاشق و غیره.