

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نپاشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Scientific

علمی

داکتر محمد کریم فارغی-استرالیا

۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰



داکتر محمد کریم فارغی

مختصری در مورد واکسین "پولیو"، ضرورت و مراحل آن!

هموطنان عزیز من!

واکسین پولیو که به قسم قطره خوراکی به اطفال شما در مراکز صحتی داده می شود، حاوی پروگرام ذیل است :
دو قطره در هنگام تولد که به آن واکسین صفری می گویند، همزمان با واکسین BCG که به طور خالکوبی در شانه راست کودکان داده می شود. گاهی این واکسین صفری پولیو توسط مسؤلین و کارمندان صحتی جدی گرفته نشده و تطبیق نمی گردد .

در سن یک و نیم ماهگی یا شش هفته، واکسین خوراکی پولیو با دیگر واکسین های دوره طفولیت مانند دیفتیری، تیتانوس و سیاه سرفه (DPT) یکجا داده می شود.

یکماه بعد یعنی در سن سه ماهگی بار دیگر، واکسین DPT تطبیق می گردد، دوره سوم یک ماه بعد و در سن چهار و نیم ماهگی با واکسین DPT باز هم واکسین خوراکی پولیو تطبیق می گردد. باید خاطر نشان کنم که با تطبیق یک بار واکسین پولیو به کودک تان تا پنج سال معافیت در مقابل مرض فلج اطفال حاصل می گردد که با تطبیق دور دوم آن به مدت ده سال معافیت حاصل می گردد، با تطبیق دوره سوم واکسین پولیو کودکان تان به طور دائمی در مقابل مرض فلج وقایه می گردند .

واکسین پولیو ویروس زنده نوع سابین است که خاصیت تولید مرضی آن تضعیف گردیده و باعث فلج نمی گردد. در حالی که وایرس وحشی پولیو که در خاک و محیط های آلوده با مواد غایطه یافت می گردد در صورتی که اطفال شما

واکسین نشده باشند، از طریق دستان آلوده، آب و مواد غذایی آلوده با مواد غایطه، داخل وجود آنها گردیده و سبب تولید مرض فلج می گردد .

شاید عده ای بپرسند که این توضیح به خاطر چه است؟

این توضیح به خاطر اینست که از مدت بیشتر از بیست سال کمپاین های سالانه واکسین پولیو به اطفال کمتر از پنج سال، در کشور ما با پول های سرسام آور منابع غربی، صورت می گیرد. یک طفلی که در سن چهار و نیم ماهگی معافیت دائمی حاصل کرده است تا سن پنج سالگی ده بار دیگر واکسین خواهد گرفت. این واکسین های اضافی در حالی که به کودکان کدام نقصان ایجاد نمی کند، در معافیت دهی آنها رول ندارند زیرا آنها با گرفتن سه دوره واکسین معافیت دائمی حاصل نموده اند. پس این واکسین های اضافی به چه منظور است؟

جهان غرب تصمیم گرفته اند ویروس وحشی پولیو را که قبلاً از آن نام بردم، با ویروس سابین یعنی ویروسی که در واکسین است، با خوراندن بار بار به کودکان، عوض کنند، زیرا وقتی کودکان هزاران ویروس را که در واکسین وجود دارند، می خورند، پس از یک اسهال خفیف، آنها را در محیط خارج می کنند. این پروسه سالهاست جریان دارد و تا وقتی دوام می کند که ویروس وحشی دیگر در لابراتوار یافت نشود .

نکته ای که من همه وقت چه در پاکستان و چه هم در افغانستان با مقامات و مسئولین صحتی ملی و بین المللی مطرح می کردم، این بود که پروگرام ریشه کن ساختن پولیو یک اولویت بین المللی است در حالی که اولویت ملی ما تقویت پروگرام های واکسیناسیون روتین از جمله سرخکان است که سالانه هزاران کودک ما را به کام مرگ می برد. ما به شرطی قطرات اضافی واکسین پولیو را به اطفال خود می خورانیم که شما سیستم معافیت کودکان ما را از طریق تمویل مالی سیستم مؤثر و فعال واکسیناسیون روتین، مساعدت کنید .

حال اگر کودکان تان سه دوره واکسین پولیو را گرفته اند، مطمئن باشید که آنها در مقابل فلج معافیت دائمی دارند، به همین ترتیب اگر سه دوره DPT گرفته اند، در مقابل سیاه سرفه، تیتانوس و دیفتیری کاملاً معاف هستند. واکسین سرخکان در سن ۹ ماهگی یکبار تطبیق می گردد و مطالعات اخیر ثابت کرده است که واکسین سرخکان سیستم عمومی معافیتی اطفال را شدیداً تکان می دهد و اطفال را در مقابل بسیاری از امراض دیگر نیز مقاوم می سازد.